



ESP-001

Crapaud accoucheur

Alytes obstetricans



Mares, rocailles et murets

Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
LC	NT		Annexe IV		X	

HABITATS

Le Crapaud accoucheur apprécie particulièrement les lieux rocailleux et chauds, proposant divers abris : vieux murs en pierres, rocailles, terrasses aux dalles descellées mais aussi carrières en exploitation. En Indre-et-Loire, on le trouve souvent à proximité des habitations. Pour se reproduire, dès le mois de mars et jusqu'à la fin de l'été, il va rechercher des points d'eaux variés : mares, ruisseaux, bassins, ornières, etc.

MENACES

- Comblement des mares
- Présence de poissons
- Pollution chimique
- Introduction d'espèces exotiques envahissantes
- Rénovation et suppression des vieux murs et murets en pierres
- Prédation : chats et volailles
- Fin d'exploitation des carrières : gestion sans prise en compte de l'espèce et ses sites de ponte
- Densification du réseau routier et artificialisation des sols

MESURES DE CONSERVATION

- Restauration et création de mares et bassins (cf fiche CCVA-03)
 - ✓ Pas de poissons
 - ✓ Plantes locales
 - ✓ Pentes douces
- Zones tampons sans pesticides autour des zones humides
- Maintien de vieux murets en pierres ou restauration en conservant des trous et fissures
- Tas de pierres et de bois (abris)
- Limiter la divagation des chats
- Gestion des carrières après exploitation maintien/création de dépressions (bassins, ornières) pour la ponte
- Sensibilisation des propriétaires et des exploitants des carrières



C'est le mâle qui porte les œufs sur son dos jusqu'à l'éclosion dans l'eau



Détail de l'œil du Crapaud accoucheur


Phénologie (période d'activité) :

Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Présent toute l'année, le Crapaud accoucheur réalise l'ensemble de son cycle sur le territoire de la CCVA.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des et Reptiles et Amphibiens d'Indre-et-Loire. SHT, SEPANT, ANEPE Caudalis (Dutertre A., Mahé L., Sansault E. et Tinchant A.). 2020

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-002

Crapaud calamite

Epidalea calamita

Mares temporaires
et milieux sableux

Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
LC	NT	X	Annexe IV		X	

HABITATS

Le Crapaud calamite affectionne les milieux sableux où il peut s'enfouir pendant la journée, lui offrant une protection contre les prédateurs et les fortes chaleurs estivales. Pour se reproduire, de fin mars à fin juin, il choisit des points d'eau temporaires, peu profonds et ensoleillés. C'est le cas notamment des bassins de carrières, des queues d'étangs, des mares temporaires ou des dépressions humides (en terrains agricoles par exemple).

MENACES

- Assèchement des zones humides
- Comblement des mares, fossés et ornières
- Artificialisation des plans d'eau
- Présence de poissons
- Pollution chimique
- Introduction d'espèces exotiques envahissantes
- Fin d'exploitation des carrières : gestion sans prise en compte de l'espèce et ses sites de ponte
- Densification du réseau routier et artificialisation des sols

MESURES DE CONSERVATION

- Maintien des fossés et ornières
 - Drainage
 - Remblais
- Maintien et création de dépressions humides dans les prairies
- Restauration et création de mares (cf fiche CCVA-03)
 - ✓ Pas de poissons
 - ✓ Plantes locales
 - ✓ Pentés douces
- Zones tampons sans pesticides autour des zones humides
- Gestion des carrières après exploitation : maintien/création de dépressions (bassins, ornières) pour la ponte
- Sensibilisation des propriétaires et des exploitants des carrières




Crapaud calamite dans une mare, un de ses milieux de reproduction



Crapaud calamite dans une carrière


Phénologie (période d'activité) :

Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA ?

Présent toute l'année, le Crapaud calamite réalise l'ensemble de son cycle sur le territoire de la CCVA.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des et Reptiles et Amphibiens d'Indre-et-Loire. SHT, SEPANT, ANEPE Caudalis (Dutertre A., Mahé L., Sansault E. et Tinchant A.). 2020

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-003

Grenouille agile

Rana dalmatina



Mares près de boisements

Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
LC	LC		Annexe IV		X	

HABITATS

La Grenouille agile fréquente divers milieux, avec une préférence pour les terrains frais et inondables : boisements, prairies humides, mais aussi cultures et jardins. Active la nuit, elle se cache souvent sous les feuilles mortes en journée.

A partir de la mi-février et jusqu'en juillet, la Grenouille agile retrouve ses sites de ponte pour se reproduire : mares, étangs, fossés ou ornières, souvent près des boisements.

MENACES

- Comblement des mares, fossés et ornières
- Artificialisation des plans d'eau
- Présence de poissons
- Pollution chimique
- Introduction d'espèces exotiques envahissantes
- Densification du réseau routier et artificialisation des sols
- Intensification des coupes forestières et suppression du bois mort au sol
- Diminution et fragmentation des réseaux de haies et bosquets

MESURES DE CONSERVATION

- Restauration et création de mares (cf fiche CCVA-03) :
 - ✓ Pas de poissons
 - ✓ Plantes locales
 - ✓ Pentes douces
- Maintien des fossés et ornières
 - Drainage
 - Remblais
- Pas de fauche/broyage au printemps et en été
- Zones tampons sans pesticides autour des zones humides
- Vitesse de circulation réduite et panneaux d'avertissement sur les routes forestières
- Conserver des tas de feuilles, souches et bois mort au sol
- Création de haies et entretien adapté (cf fiche CCVA-06)




Grenouille agile, avec son masque et sa couleur brune caractéristiques



Pontes de Grenouille agile

Phénologie (période d'activité) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Présente toute l'année, en milieu aquatique ou terrestre, la Grenouille agile réalise tout son cycle sur le territoire de la CCVA.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des Reptiles et Amphibiens d'Indre-et-Loire. SHT, SEPANT, ANEPE Caudalis (Dutertre A., Mahé L., Sansault E. et Tinchant A.). 2020

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-004

Groupe des Grenouilles vertes

Pelophylax sp.



Mares, bassins, étangs

Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
NT	LC		Annexe V		X	

HABITATS

Réunissant 3 espèces difficiles à différencier (Grenouille de Lessona, Grenouille rieuse et Grenouille commune), le groupe des Grenouilles vertes fréquente tous types d'habitats aquatiques : mares, étangs, bassins, petits et grands cours d'eau, etc. Visibles facilement en période de reproduction (printemps), elles sont actives jour et nuit et peuvent même être aperçues lors de journées plus douces en hiver.

MENACES

- Assèchement des zones humides
- Comblement des mares
- Artificialisation des plans d'eau
- Présence de poissons
- Pollution chimique
- Introduction d'espèces exotiques envahissantes
- Densification du réseau routier et artificialisation des sols
- Diminution et fragmentation des réseaux de haies

MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (notamment sur la Grenouille de Lessona)
- Restauration et création de mares (cf fiche CCVA-03) :
 - ✓ Pas de poissons
 - ✓ Plantes locales
 - ✓ Pentes douces
- Maintien des fossés et ornières
 - ⊖ Drainage
 - ⊖ Remblais
- Pas de fauche/broyage au printemps et en été (fossés, bords de mares et d'étangs)
- Zones tampons sans pesticides autour des zones humides
- Entretien adapté (cf fiche CCVA-06) et création de haies
- Sensibilisation des propriétaires




Grenouille verte mâle en train de chanter : ses sacs vocaux sont gonflés.



Grenouille verte, avec ses tâches noires et sa ligne dorsale vert clair

Phénologie (période d'activité) :




Nombre d'observations de la Grenouille commune par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Présentes toute l'année, les Grenouilles vertes réalisent l'ensemble de leur cycle sur le territoire de la CCVA.

Localisation des données de présence de la Grenouille rieuse sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des et Reptiles et Amphibiens d'Indre-et-Loire. SHT, SEPANT, ANEPE Caudalis (Dutertre A., Mahé L., Sansault E. et Tinchant A.). 2020

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-005

Rainette verte

Hyla arborea



Mares végétalisées

Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
NT	LC		Annexe IV		X	

HABITATS

Si elle aime particulièrement les mares ensoleillées et peu profondes, la Rainette verte se rencontre aussi dans les étangs, fossés, ruisseaux, sources, etc. durant la reproduction (mars à juin). Seule condition : la proximité de végétation dense (massettes, roseaux) pour ses baignades de soleil. Au cours de l'été, elle retourne dans son habitat terrestre et arboricole (haies, buissons ou lisières proches) pour passer l'automne et l'hiver.

MENACES

- Assèchement des zones humides
- Comblement des mares
- Artificialisation des plans d'eau
- Présence de poissons
- Pollution chimique
- Introduction d'espèces exotiques envahissantes
- Densification du réseau routier et artificialisation des sols
- Diminution et fragmentation des réseaux de haies et bosquets

MESURES DE CONSERVATION

- Restauration et création de mares (cf fiche CCVA-03) :
 - ✓ Pas de poissons
 - ✓ Plantes locales
 - ✓ Pentes douces
- Maintien des fossés et ornières
 - Drainage
 - Remblais
- Pas de fauche/broyage au printemps et en été (fossés, bords de mares et d'étangs)
- Zones tampons sans pesticides autour des zones humides
- Maintien d'un ourlet herbacé en pied de haies et de lisières
- Création de haies et entretien adapté (cf fiche CCVA-06)
- Sensibilisation des propriétaires




Rainette verte mâle en train de chanter



Rainette verte prenant un bain de soleil

Phénologie (période d'activité) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Présente toute l'année, en milieu aquatique ou terrestre, la Rainette verte réalise tout son cycle sur le territoire de la CCVA.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des et Reptiles et Amphibiens d'Indre-et-Loire. SHT, SEPANT, ANEPE Caudalis (Dutertre A., Mahé L., Sansault E. et Tinchant A.). 2020

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-006

Salamandre tachetée

Salamandra salamandra

Mares, ornières et
fossés forestiers

Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
LC	LC				X	

HABITATS

Espèce forestière, la Salamandre tachetée vit dans les boisements aux sols imperméables, capables de retenir l'eau en surface dans les fossés, les ornières et les mares. C'est ici que ses larves vont se développer (elle ne pond pas d'œufs) de la fin de l'été au début du printemps suivant. Préférant les bois de feuillus aux résineux, elle fréquente les grandes forêts comme les bosquets isolés tant qu'ils possèdent un point d'eau.

MENACES

- Assèchement des zones humides
- Comblement des mares et des ornières en milieu forestier
- Artificialisation des plans d'eau
- Pollution chimique
- Densification du réseau routier et artificialisation des sols
- Plantations de résineux
- Intensification des coupes forestières et suppression du bois mort au sol
- Diminution et fragmentation des réseaux de bosquets et de haies

MESURES DE CONSERVATION

- Restauration et création de mares (cf fiche CCVA-03) :
 - ✓ Pas de poissons
 - ✓ Plantes locales
 - ✓ Pentes douces
- Maintien des ornières le long des chemins forestiers
- Vitesse de circulation réduite et panneaux d'avertissement sur les routes forestières
- Maintien des forêts de feuillus, pas de plantation de résineux
- Pas de coupe à blanc près des points d'eau
- Maintien du bois mort au sol
- Sensibilisation des propriétaires, des gestionnaires (ONF par exp) et des usagers des forêts et boisements



Chaque individu de Salamandre tachetée arbore des motifs uniques.



Salamandre tachetée (vue dorsale)


Phénologie (période d'activité) :

Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Présente toute l'année, la Salamandre tachetée réalise l'ensemble de son cycle sur le territoire de la CCVA.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des et Reptiles et Amphibiens d'Indre-et-Loire. SHT, SEPANT, ANEPE Caudalis (Dutertre A., Mahé L., Sansault E. et Tinchant A.). 2020

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-007

Triton crête

Triturus cristatus



Mares

Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
NT	NT	X	Annexes II & IV		X	

HABITATS

Dès janvier, le Triton crête fréquente majoritairement des mares permanentes pour s'y reproduire. Assez profondes et ensoleillées, végétalisées mais sans poissons, elles se situent souvent à proximité des milieux agricoles (prairies, cultures). On peut aussi le trouver dans des fossés, des queues d'étang ou des bassins de carrière. À l'automne, il rejoint des abris terrestres proches (pierres, tas de bois, galeries de rongeurs).

MENACES

- Assèchement des zones humides
- Comblement des mares
- Artificialisation des plans d'eau
- Présence de poissons
- Pollution chimique des mares et milieux environnants (cultures)
- Introduction d'espèces exotiques envahissantes
- Densification du réseau routier et artificialisation des sols
- Diminution et fragmentation des réseaux de haies
- Suppression du bois mort au sol

MESURES DE CONSERVATION

- Restauration et création de mares (cf fiche CCVA-03) :
 - ✓ Pas de poissons
 - ✓ Plantes locales
 - ✓ Pentes douces
- Zones tampons sans pesticides autour des zones humides
- Vitesse de circulation réduite et panneaux d'avertissement à proximité des mares
- Maintien d'un ourlet herbacé en pied de haies et de lisières
- Création de haies et entretien adapté (cf fiche CCVA-06)
- Maintien du bois mort au sol
- Mise en place de plans de gestion



Triton crête mâle, portant une crête seulement en période nuptiale



Face ventrale de Triton crête


Phénologie (période d'activité) :

Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Présent toute l'année, en milieu aquatique ou terrestre, le Triton crête réalise tout son cycle sur le territoire de la CCVA.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des et Reptiles et Amphibiens d'Indre-et-Loire. SHT, SEPANT, ANEPE Caudalis (Dutertre A., Mahé L., Sansault E. et Tinchant A.). 2020

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-008

Triton marbré

Triturus marmoratus



Mares forestières

Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
NT	VU	X	Annexe IV		X	

HABITATS

Le Triton marbré est le plus forestier de nos tritons. Au printemps, il se reproduit essentiellement dans des mares ou des étangs forestiers sans poissons, pourvus de végétation et assez profonds. Après la reproduction, le Triton marbré se déplace (à proximité des lieux de ponte) vers des habitats terrestres qui lui fourniront le gîte et le couvert pour l'hiver : sous des pierres, des souches, dans des bois ou des haies.

MENACES

- Assèchement des zones humides
- Comblement des mares
- Artificialisation des plans d'eau
- Présence de poissons
- Pollution chimique
- Introduction d'espèces exotiques envahissantes
- Densification du réseau routier et artificialisation des sols
- Intensification des coupes forestières et suppression du bois mort au sol
- Diminution et fragmentation des réseaux de haies

MESURES DE CONSERVATION

- Restauration et création de mares (cf fiche CCVA-03) :
 - ✓ Pas de poissons
 - ✓ Plantes locales
 - ✓ Pentes douces
- Vitesse de circulation réduite et panneaux d'avertissement sur les routes forestières
- Pas de coupe à blanc près des sites de ponte
- Maintien du bois mort au sol
- Maintien d'un ourlet herbacé en pied de haies et de lisières
- Création de haies et entretien adapté (cf fiche CCVA-06)
- Mise en place de plans de gestion



Triton marbré mâle, portant une crête seulement en période nuptiale



Triton marbré femelle (vue dorsale)

Phénologie (période d'activité) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Présent toute l'année, en milieu aquatique ou terrestre, le Triton marbré réalise tout son cycle sur le territoire de la CCVA.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des et Reptiles et Amphibiens d'Indre-et-Loire. SHT, SEPANT, ANEPE Caudalis (Dutertre A., Mahé L., Sansault E. et Tinchant A.). 2020

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-009

Triton palmé

Lissotriton helveticus



Mares, ornières et fossés

Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
LC	LC				X	

HABITATS

Peu exigeant et présent dans des milieux variés, le Triton palmé fréquente mares, queues d'étangs, ornières, fossés, ou encore sources en période de reproduction (printemps-été). La présence de végétation aquatique et l'absence de poissons restent néanmoins indispensables. En automne et en hiver, le Triton palmé se cache dans des abris terrestres (souches, galeries de rongeurs, caves des habitations).

MENACES

- Assèchement des zones humides
- Comblement des mares
- Artificialisation des plans d'eau
- Présence de poissons
- Pollution chimique des mares et milieux environnants (cultures)
- Introduction d'espèces exotiques envahissantes
- Densification du réseau routier et artificialisation des sols
- Diminution et fragmentation des réseaux de haies
- Suppression du bois mort au sol

MESURES DE CONSERVATION

- Restauration et création de mares (cf fiche CCVA-03) :
 - ✓ Pas de poissons
 - ✓ Plantes locales
 - ✓ Pentes douces
- Maintien des fossés et ornières
 - Drainage
 - Remblais
- Pas de fauche/broyage au printemps et en été (fossés, bords de mares et d'étangs)
- Zones tampons sans pesticides autour des zones humides
- Vitesse de circulation réduite et panneaux d'avertissement à proximité des mares
- Création de haies et entretien adapté (cf fiche CCVA-06)
- Maintien du bois mort au sol




Triton palmé mâle, avec ses larges palmures (pattes arrières) et son filament au bout de la queue



Triton palmé en phase terrestre

Phénologie (période d'activité) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Présent toute l'année, en milieu aquatique ou terrestre, le Triton palmé réalise tout son cycle sur le territoire de la CCVA.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des reptiles et Amphibiens d'Indre-et-Loire. SHT, SEPANT, ANEPE Caudalis (Dutertre A., Mahé L., Sansault E. et Tinchant A.). 2020

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-010

Triton ponctué

Lissotriton vulgaris

Mares ensoleillées
et végétalisées

Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
NT	EN	X	Annexes II & IV		X	

HABITATS

Au printemps, le plus rare des tritons d'Indre-et-Loire se reproduit essentiellement dans des mares ensoleillées, avec beaucoup de végétation, des eaux claires et sans poissons. Elles se situent en milieux variés : prairies, lisières forestières, boisements et parfois zones agricoles. À la fin de l'été, le Triton ponctué se déplace vers un abri à proximité pour passer l'hiver (pierres, souches, galeries de rongeurs).

MENACES

- Assèchement des zones humides
- Comblement des mares
- Artificialisation des plans d'eau
- Présence de poissons
- Pollution chimique
- Introduction d'espèces exotiques envahissantes
- Densification du réseau routier et artificialisation des sols
- Intensification des coupes forestières et suppression du bois mort au sol
- Diminution et fragmentation des réseaux de haies

MESURES DE CONSERVATION

- Restauration et création de mares (cf fiche CCVA-03) :
 - ✓ Pas de poissons
 - ✓ Plantes locales
 - ✓ Pentes douces
- Zones tampons sans pesticides autour des zones humides
- Vitesse de circulation réduite et panneaux d'avertissement à proximité des mares
- Pas de coupe à blanc près des sites de ponte
- Maintien du bois mort au sol
- Création de haies et entretien adapté (cf fiche CCVA-06)
- Mise en place de plans de gestion




Triton ponctué mâle, portant une crête seulement en période nuptiale



Face ventrale de Triton ponctué mâle


Phénologie (période d'activité) :

Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Présent toute l'année, en milieu aquatique ou terrestre, le Triton ponctué réalise tout son cycle sur le territoire de la CCVA.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des et Reptiles et Amphibiens d'Indre-et-Loire. SHT, SEPANT, ANEPE Caudalis (Dutertre A., Mahé L., Sansault E. et Tinchant A.). 2020

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))