



ESP-027

Hoplie bleue

Hoplia coerulea



Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
		X				

HABITATS

L'Hoplie bleue est un coléoptère qui se rencontre sur les plantes basses à proximité des cours d'eau, les ruisseaux, les fossés.

L'espèce est bien répandue dans le bassin de la Loire.

MENACES


- Curage des fossés et reprofilage des berges de rivières, ruisseaux
- Fauche précoce
- Fragmentation de son habitat

MESURES DE CONSERVATION

- Maintenir des bandes enherbées près des rivières, ruisseaux et fossés
- Fauche tardives à réaliser après le mois de juillet (cf fiche CCVA-08)
- Sensibilisation des riverains




Hoplie bleue (*Hoplia coerulea*)



Bord de cours d'eau favorable

Phénologie (période d'activité) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Réalise son cycle complet au sein du territoire de la CCVA. La période de vol s'étend de juin à juillet.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))
- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-028

Grand capricorne *Cerambyx cerdo*



Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Protection nationale	Protection régionale
Non évalué	Non évalué	X	Annexe II et IV	X	

HABITATS

Ce longicorne fréquente les forêts de feuillus – notamment les lisières exposées –, mais aussi et surtout les arbres isolés dans le bocage.

Les femelles pondent dans les bois sénescents de feuillus (Orme, Frêne, Chênes...). Après 3 à 5 ans de développement larvaire et nymphose, les adultes quittent leur loge et sont prêts à se reproduire.

MENACES


- Sylviculture moderne privilégiant les résineux aux feuillus
- Arrachage systématique des vieux arbres isolés et des haies bocagères en lien avec la déprise de l'élevage
- Fragmentation des habitats

MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Maintien d'arbres âgés favorables à la ponte autant en zone forestière que bocagère
- Conservation d'îlots de sénescence
- Plantation de haies bocagères afin d'assurer sa reproduction à long terme




Grand capricorne (*Cerambyx cerdo*)



Arbre mort favorable à sa reproduction

Phénologie (période d'activité) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Présent toute l'année, le Grand capricorne réalise l'ensemble de son cycle sur le territoire de la CCVA.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))
- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))