



# Aigle botté

## *Hieraaetus pennatus*



### Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
NT	EN	X		Annexe I	X	

### HABITATS

Ce petit aigle de la taille d'une Buse fréquente les régions boisées calmes, aussi bien les forêts de feuillus que les pinèdes où il construit son nid généralement sur un arbre mature. Il est présent de mars à octobre avant de partir hiverner en Afrique. Rapace discret, on peut l'observer en chasse au-dessus des champs.

### MENACES

- Perte de son habitat due à l'exploitation forestière
- Dérangements humains (travaux forestiers, tourisme...)
- Collision avec des installations humaines (lignes électriques, éoliennes...)

### MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Conservation d'îlot de vieillissement et entretien adapté des parcelles forestières
- Sensibilisation des propriétaires et forestiers



Aigle botté forme claire



Aigle botté forme sombre

### Phénologie (période de présence) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire  
© Nature'O'Centre

### Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Migrateur, l'Aigle botté est uniquement présent en période de reproduction sur le territoire de la CCVA.

### Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des oiseaux de France métropolitaine. LPO, MNHN, SEOF (Issa N. & Muller Y.). 2015

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



# Alouette lulu

## *Lullula arborea*



### Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
NA	LC			Annexe I	X	

### HABITATS

Cette petite alouette affectionne les milieux thermophiles (secs et ensoleillés). On la retrouve dans les vignobles, les bocages, les prairies sèches ou les coupes forestières. Surtout présente en saison estivale, certains individus peuvent être observés durant l'hiver.

### MENACES

- Altération de ses habitats
- Travaux agricoles (labours, fauches...)
- Diminution de sa ressource alimentaire due à la pollution chimique (insecticides notamment)

### MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Conservation et entretien adapté des prairies (cf fiche CCVA-08)
- Diminution de l'utilisation d'insecticides
- Sensibilisation des propriétaires



© A.LORIEUX

Alouette lulu



© M. HALIN

Alouette lulu posée sur piquet

### Phénologie (période de présence) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire  
© Nature'O'Centre

### Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Migratrice partielle, l'Alouette lulu réalise aussi bien son hivernage que sa reproduction sur le territoire de la CCVA.

### Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des oiseaux de France métropolitaine. LPO, MNHN, SEOF (Issa N. & Muller Y.). 2015

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



# Balbusard pêcheur

## *Pandion haliaetus*



### Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
LC	EN	X		Annexe I	X	

### HABITATS

Le Balbusard pêcheur est une espèce migratrice, hivernant en Afrique, qui revient au printemps pour se reproduire. Il fréquente les grands massifs boisés calmes à proximité des lieux de pêche pour y construire son nid. Il est régulièrement vu sur la Loire en action de pêche.

### MENACES

- Perte de son habitat due à l'exploitation forestière
- Dérangements humains (travaux forestiers, tourisme...)
- Pollution (pesticides...)
- Collision avec des installations humaines (lignes électriques, éoliennes...)

### MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Conservation d'îlot de vieillissement et entretien adapté des parcelles forestières
- Diminution de l'utilisation de produits phytosanitaires
- Sensibilisation des propriétaires forestiers



© A. LORIEUX


Balbusard pêcheur en vol



© P. CABARD

Balbusard pêcheur posé avec sa proie

### Phénologie (période de présence) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire  
© Nature'O'Centre

### Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

La Balbusard pêcheur est uniquement présent en période de reproduction sur le territoire de la CCVA.

### Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des oiseaux de France métropolitaine. LPO, MNHN, SEOF (Issa N. & Muller Y.). 2015

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



# Bouvreuil pivoine

## *Pyrrhula pyrrhula*



### Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
NA	VU	X			X	

### HABITATS

Ce passereau est avant tout un oiseau forestier, préférant les forêts claires mais on peut aussi le retrouver dans des milieux plus ouverts constitués de bocages riches en haies. Sur le territoire du Val d'Amboise, il est surtout présent dans le massif forestier d'Amboise.

### MENACES

- Perte de son habitat : exploitation intensive des forêts, diminution et fragmentation des réseaux de haies
- Diminution de sa ressource alimentaire due à la pollution chimique (insecticides notamment)




Bouvreuil pivoine mâle



Bouvreuil pivoine femelle

### Phénologie (période de présence) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire  
© Nature'O'Centre

### Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Le Bouvreuil pivoine est présent toute l'année sur le territoire de la CCVA.

### Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



### MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Conservation, création et entretien adapté des haies (cf fiche CCVA-06)
- Diminution de l'utilisation d'insecticides
- Sensibilisation des propriétaires

Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des oiseaux de France métropolitaine. LPO, MNHN, SEOF (Issa N. & Muller Y.). 2015

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



# Bruant des roseaux

## *Emberiza schoeniclus*



### Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
NA	VU	X			X	

### HABITATS

Le Bruant des roseaux est inféodé aux milieux humides. On le retrouve généralement dans les roselières, les hautes herbes et les ripisylves à proximité des cours d'eau, plans d'eau ou des zones marécageuses.

### MENACES

- Perte de son habitat : dégradation des zones humides, diminution et fragmentation des réseaux de haies
- Diminution de sa ressource alimentaire due à la pollution chimique (insecticides notamment)

### MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Conservation, création et entretien adapté des zones humides
- Diminution de l'utilisation d'insecticides
- Sensibilisation des propriétaires




Bruant des roseaux mâle



Bruant des roseaux femelle

### Phénologie (période de présence) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire  
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Le Bruant des roseaux est présent toute l'année sur le territoire de la CCVA.

### Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des oiseaux de France métropolitaine. LPO, MNHN, SEOF (Issa N. & Muller Y.). 2015

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



# Busard cendré

## *Circus pygargus*



### Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
NA	VU	X		Annexe I	X	

### HABITATS

Rapace migrateur, le Busard cendré hiverne en Afrique et revient en Europe (d'avril à septembre) pour se reproduire. Il affectionne les milieux ouverts où il niche dans les champs cultivés. Anciennement nicheur dans les plaines agricoles du territoire du Val d'Amboise, quelques individus peuvent être observés en chasse au-dessus des cultures.

### MENACES

- Perte de son habitat : Diminution des prairies naturelles et marais
- Destruction du nid due aux travaux agricoles : moissons
- Diminution de sa ressource alimentaire due à la pollution chimique

### MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Conservation, création et entretien adapté des prairies naturelles (*cf* fiche CCVA-08)
- Protection des nids avant moisson
- Diminution de l'utilisation de produits phytosanitaires
- Sensibilisation des agriculteurs




Busard cendré mâle



Busard cendré femelle

### Phénologie (période de présence) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire  
© Nature'O'Centre

### Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Le Busard cendré est uniquement présent en période de reproduction sur le territoire de la CCVA.

### Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))
- *Atlas des oiseaux de France métropolitaine*. LPO, MNHN, SEOF (Issa N. & Muller Y.). 2015
- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



# Chevalier guignette

## *Actitis hypoleucos*



### Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
DD	EN	X			X	

### HABITATS

Migrateur, le Chevalier guignette hiverne en Afrique pour revenir au printemps se reproduire en Europe. On le retrouve sur les berges des étangs et cours d'eau où il fréquente bancs de galets ou de sable pourvus de végétation pour y nicher. On le retrouve surtout sur les rives de la Loire où il effectue sa nidification.

### MENACES

- Perte de son habitat : artificialisation des cours d'eau...
- Dérangements humains (promeneurs, canoës...)
- Diminution de sa ressource alimentaire due à la pollution chimique

### MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Protection des sites de nidification
- Diminution de l'utilisation des pesticides
- Sensibilisation des usagers d'activités aquatiques




Chevalier guignette en recherche de nourriture



Chevalier guignette

### Phénologie (période de présence) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire  
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Le Chevalier guignette est principalement présent pendant sa période de reproduction.

### Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des oiseaux de France métropolitaine. LPO, MNHN, SEOF (Issa N. & Muller Y.). 2015

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-070

# Cigogne noire

## *Ciconia nigra*



### Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
VU	CR	X		Annexe I	X	

### HABITATS

La Cigogne noire est une espèce migratrice qui hiverne en Afrique. Elle revient en Europe au printemps pour se reproduire où elle fréquente les boisements matures et calmes abritant des cours d'eau, étangs ou marais.

### MENACES

- Perte de son habitat due à l'exploitation forestière
- Dérangements humains (travaux forestiers, tourisme...)
- Pollution (pesticides...)
- Collision avec des installations humaines (lignes électriques, éoliennes...)

### MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Conservation d'îlot de vieillissement et entretien adapté des parcelles forestières
- Diminution de l'utilisation de produits phytosanitaires
- Sensibilisation des propriétaires forestiers




Cigogne noire en vol



Cigogne noire posée

### Phénologie (période de présence) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire  
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

La Cigogne noire est uniquement présente en période de reproduction sur le territoire de la CCVA.

### Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des oiseaux de France métropolitaine. LPO, MNHN, SEOF (Issa N. & Muller Y.). 2015

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



# Circaète Jean-le-Blanc

## *Circaetus gallicus*



### Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
LC	VU	X		Annexe I	X	

### HABITATS

Le Circaète Jean-le-Blanc est une espèce migratrice qui nous revient d'Afrique fin mars pour se reproduire. Il fréquente les milieux ouverts pour chasser à la recherche de serpents et les boisements matures et calmes. Sur le territoire du Val d'Amboise, on le retrouve à proximité du massif forestier d'Amboise.

### MENACES

- Perte de son habitat due à l'exploitation forestière
- Dérangements humains (travaux forestiers, tourisme...)
- Diminution de sa ressource alimentaire (principalement des serpents)

### MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Conservation d'îlot de vieillissement et entretien adapté des parcelles forestières
- Sensibilisation des propriétaires forestiers



© N. ISSA

Circaète Jean-le-Blanc en vol



© A. LORIEUX

Circaète Jean-le-Blanc posé

### Phénologie (période de présence) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire  
© Nature'O'Centre

### Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Le Circaète Jean-le-Blanc est uniquement présent en période de reproduction sur le territoire de la CCVA.

### Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des oiseaux de France métropolitaine. LPO, MNHN, SEOF (Issa N. & Muller Y.). 2015

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



# Hirondelle de fenêtre

## *Delichon urbicum*



### Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
NT	LC				X	

### HABITATS

Migratrice, l'Hirondelle de fenêtre revient en Europe en avril pour y nicher. On la retrouve aussi bien à la campagne qu'à la ville. Espèce grégaire, elle niche en colonie en général proche des habitations. En plus la colonie importante présente sur le Château d'Amboise, plusieurs nids ont été recensés dans plusieurs bourgs du territoire du Val d'Amboise.



Hirondelle de fenêtre nourrissant au nid



Hirondelle de fenêtre au nid

### MENACES

- Diminution de ses sites de reproduction
- Rénovation des bâtiments avec destruction des nids
- Diminution de sa ressource alimentaire due à la pollution chimique (insecticides notamment)

### Phénologie (période de présence) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire  
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

L'Hirondelle de fenêtre réalise uniquement sa reproduction sur le territoire de la CCVA.

### Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



### MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Conservation et création de sites de nidification (cf fiche CCVA-01)
- Diminution de l'utilisation d'insecticides
- Sensibilisation des propriétaires

Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des oiseaux de France métropolitaine. LPO, MNHN, SEOF (Issa N. & Muller Y.). 2015

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



# Huppe fasciée

## *Upupa epops*



### Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
NA	LC	X			X	

### HABITATS

La Huppe fasciée est une espèce migratrice qui nous revient d'Afrique dès la fin mars pour se reproduire. Elle fréquente les campagnes ouvertes et bocagères où se côtoient prairies, pâtures et haies. Elle peut aussi être observée dans les vignes et les vergers.

### MENACES

- Perte de son habitat : diminution et fragmentation des réseaux de haies
- Diminution de sa ressource alimentaire due à la pollution chimique (insecticides notamment)

### MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Conservation, création et entretien adapté des haies (cf fiche CCVA-06)
- Diminution de l'utilisation d'insecticides
- Sensibilisation des propriétaires



© N.ISSA

Huppe fasciée en recherche de nourriture



© P.CABARD

Huppe fasciée posée

### Phénologie (période de présence) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire  
© Nature'O'Centre

### Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Présente uniquement à la saison estivale, la Huppe fasciée réalise sa reproduction sur le territoire de la CCVA.

### Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))
- Atlas des oiseaux de France métropolitaine. LPO, MNHN, SEOF (Issa N. & Muller Y.). 2015
- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



# Martin pêcheur d'Europe

## *Alcedo atthis*



### Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
VU	LC	X		Annexe I	X	

### HABITATS

Cet oiseau emblématique des cours d'eau aux couleurs chatoyantes fréquente le bord des eaux qu'elles soient stagnantes ou courantes. En période de reproduction, il niche dans les berges abruptes généralement sableuses. Sur le Val d'Amboise, on le retrouve surtout sur la Loire mais aussi sur beaucoup de petit cours d'eau qui parcourent le territoire.

### MENACES

- Perte de son habitat : aménagements qui affectent la naturalité des berges
- Pollution de l'eau
- Diminution de la ressource en poisson

### MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Conservation et entretien adapté des berges
- Diminution de l'utilisation de produits phytosanitaires
- Sensibilisation des propriétaires




Pie-grièche écorcheur mâle



Martin-pêcheur d'Europe femelle

### Phénologie (période de présence) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire  
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Le Martin pêcheur d'Europe est présent toute l'année sur le territoire de la CCVA.

### Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des oiseaux de France métropolitaine. LPO, MNHN, SEOF (Issa N. & Muller Y.). 2015

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



# Moineau friquet

## *Passer montanus*



### Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
EN	EN	X			X	

### HABITATS

Contrairement à son cousin le Moineau domestique, on retrouve plus le Moineau friquet dans les espaces ruraux et moins dans les zones urbanisées. Il affectionne les fermes et villages avec leurs cortège de jardins, vergers et haies. Deux petites populations sont encore présentes sur les communes d'Amboise et de Cangey.

### MENACES

- Perte de son habitat et de ses sites de reproduction
- Diminution et fragmentation des réseaux de haies
- Raréfaction des cavités due à la rénovation des bâtiments
- Diminution de sa ressource alimentaire due à la pollution chimique (insecticides notamment)

### MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances
- Conservation et création de sites de nidification en évitant les obturations systématiques de trous (*cf fiche CCVA-01*)
- Rendre accessible l'intérieur de certains bâtiments en laissant une ouverture
- Création et entretien adapté des haies (*cf fiche CCVA-06*)
- Diminution de l'utilisation d'insecticides
- Sensibilisation des propriétaires



© D. BARRAUD


Moineau friquet posé



© D. BARRAUD

Moineau friquet à la sortie du nid

### Phénologie (période de présence) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire  
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Le Moineau friquet est présent toute l'année sur le territoire de la CCVA.

### Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))
- *Atlas des oiseaux de France métropolitaine*. LPO, MNHN, SEOF (Issa N. & Muller Y.). 2015
- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



# Pic épeichette

## *Dendrocopos minor*



### Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
VU	NT	X			X	

### HABITATS

Le Pic épeichette est le plus petit des pics d'Europe, à peine plus grand qu'un moineau. Il affectionne les forêts assez claires de feuillus, avec prédominance de chênes. Mais il est aussi possible de le retrouver dans les parcs et jardins arborés.

### MENACES

- Perte de son habitat : exploitation intensive des forêts
- coupes d'arbres matures
- fragmentation des massifs forestiers

### MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Conservation d'îlot de vieillissement et de sénescence
- Entretien adapté des parcelles forestières
- Sensibilisation des propriétaires




Pic épeichette mâle



Pic épeichette femelle

### Phénologie (période de présence) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire  
© Nature'O'Centre

### Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Le Pic épeichette est présent toute l'année sur le territoire de la CCVA.

### Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- *Atlas des oiseaux de France métropolitaine*. LPO, MNHN, SEOF (Issa N. & Muller Y.). 2015

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



# Pic noir

## *Dryocopus martius*



### Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
LC	LC			Annexe I	X	

### HABITATS

Le plus grand de nos pics fréquente les forêts avec des arbres matures dans lesquels il y creuse la loge lui servant de nid. Sur le territoire du Val d'Amboise, il est très présent dans le massif forestier d'Amboise où il trouve les conditions idéales pour se reproduire.

### MENACES

- Perte de son habitat : coupes d'arbres matures et fragmentation des massifs forestiers

### MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Conservation d'îlot de vieillissement et de sénescence
- Entretien adapté des parcelles forestières
- Sensibilisation des propriétaires forestiers




Pic noir mâle



Pic noir femelle

### Phénologie (période de présence) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire  
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Le Pic noir est présent toute l'année sur le territoire de la CCVA.

### Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des oiseaux de France métropolitaine. LPO, MNHN, SEOF (Issa N. & Muller Y.). 2015

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



# Pie-grièche écorcheur

## *Lanius collurio*



### Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
NA	LC			Annexe I	X	

### HABITATS

La Pie-grièche écorcheur est une espèce migratrice qui nous revient d'Afrique au mois de mai pour se reproduire. Elle fréquente les campagnes ouvertes et bocagères où se côtoient prairies pâturées et haies d'épineux.

### MENACES

- Perte de son habitat : Diminution et fragmentation des réseaux de haies
- Diminution de sa ressource alimentaire due à la pollution chimique (insecticides notamment)

### MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Conservation, création et entretien adapté des haies (cf fiche CCVA-06)
- Diminution de l'utilisation d'insecticides
- Sensibilisation des propriétaires




Pie-grièche écorcheur mâle



Pie-Grièche écorcheur femelle

### Phénologie (période de présence) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire  
© Nature'O'Centre

### Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Présente uniquement à la saison estivale, la Pie-grièche écorcheur réalise sa reproduction sur le territoire de la CCVA.

### Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des oiseaux de France métropolitaine. LPO, MNHN, SEOF (Issa N. & Muller Y.). 2015

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



# Sterne naine

## *Sternula albifrons*



### Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
LC	LC	X		Annexe I	X	

### HABITATS

La Sterne pierregarin est une espèce migratrice qui nous revient d'Afrique au mois d'avril pour se reproduire. Elle fréquente aussi bien les zones côtières que les fleuves et étangs à l'intérieur des terres où elle utilise ilots et bancs de sable pour nicher comme c'est le cas sur la Loire où quelques individus nichent.

### MENACES

- Perte de son habitat : artificialisation des cours d'eau
- Dérangements humains (promeneurs, canoës...)
- Diminution de sa ressource alimentaire due à la pollution des eaux.

### MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Protection des sites de nidification
- Diminution de l'utilisation des pesticides
- Sensibilisation des usagers d'activités aquatiques



© E. MULOT

Sterne naine en vol



© A. BLOQUET

Sterne naine posée

### Phénologie (période de présence) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire  
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Présente uniquement à la saison estivale, la Sterne pierregarin réalise sa reproduction sur le territoire de la CCVA.

### Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des oiseaux de France métropolitaine. LPO, MNHN, SEOF (Issa N. & Muller Y.). 2015

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



# Sterne pierregarin

## *Sterna hirundo*



### Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
NA	NT	X		Annexe I	X	

### HABITATS

La Sterne pierregarin est une espèce migratrice qui nous revient d'Afrique au mois d'avril pour se reproduire. Elle fréquente aussi bien les zones côtières que les fleuves et étangs à l'intérieur des terres où elle utilise ilots et bancs de sable pour nicher. De nombreuses colonies sont présentes sur la Loire pour y nicher.

### MENACES

- Perte de son habitat : artificialisation des cours d'eau...
- Dérangements humains (promeneurs, canoës...)
- Diminution de sa ressource alimentaire due à la pollution des eaux.

### MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Protection des sites de nidification
- Diminution de l'utilisation des pesticides
- Sensibilisation des usagers d'activités aquatiques



© P. CABARD

Sterne pierregarin en vol



© A. BLOQUET

Sterne pierregarin posée

### Phénologie (période de présence) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire  
© Nature'O'Centre

### Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Présente uniquement à la saison estivale, la Sterne pierregarin réalise sa reproduction sur le territoire de la CCVA.

### Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des oiseaux de France métropolitaine. LPO, MNHN, SEOF (Issa N. & Muller Y.). 2015

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



# Tourterelle des bois

## *Streptopelia turtur*



### Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
VU	LC					

### HABITATS

La Tourterelle des bois est une espèce migratrice qui nous revient d'Afrique fin avril pour se reproduire. Elle fréquente les campagnes ouvertes parsemées d'arbres, de buissons et de haies.

### MENACES

- Espèce non-protégée et chassée.
- Perte de son habitat : Diminution et fragmentation des réseaux de haies
- Diminution de sa ressource alimentaire due à la pollution chimique (pesticides notamment)

### MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Conservation, création et entretien adapté des haies (cf fiche CCVA-06)
- Diminution de l'utilisation de pesticides
- Sensibilisation des propriétaires




Tourterelle des bois en recherche de nourriture



Tourterelle des bois posée en évidence

### Phénologie (période de présence) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire  
© Nature'O'Centre

### Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Présente uniquement à la saison estivale, la Tourterelle des bois réalise sa reproduction sur le territoire de la CCVA.

### Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des oiseaux de France métropolitaine. LPO, MNHN, SEOF (Issa N. & Muller Y.). 2015

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



# Vanneau huppé

## *Vanellus vanellus*



### Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
LC	VU	X				

### HABITATS

Le Vanneau huppé fréquente une grande variété de milieux ouverts comme les prairies sèches ou humide et les champs cultivés aussi bien pour s'y reproduire que lors des grands rassemblements hivernaux. Sur le territoire du Val d'Amboise, on le retrouve sur les parcelles agricoles et à proximité de la Loire.

### MENACES

- Perte de son habitat naturel : prairies, zones humides
- Travaux agricoles durant la nidification (labour, semis...)
- Diminution de sa ressource alimentaire due à la pollution chimique (insecticides notamment)

### MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Conservation, création et entretien des prairies (cf fiche CCVA-08)
- Diminution de l'utilisation d'insecticides
- Protection de la nichée lors des travaux agricoles
- Sensibilisation des agriculteurs



Vanneau huppé posé



Vanneau huppé dans son milieu

### Phénologie (période de présence) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire  
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Migrateur partiel, le Vanneau huppé réalise aussi bien son hivernage que sa reproduction sur le territoire de la CCVA.

### Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))

- Atlas des oiseaux de France métropolitaine. LPO, MNHN, SEOF (Issa N. & Muller Y.). 2015

- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))