



ESP-083

Conocéphale des roseaux

Conocephalus dorsalis



Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge Régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Protection nationale	Protection Régionale
EN	EN	X			

HABITATS

Le Conocéphale des roseaux se développe parmi la végétation riveraine des milieux aquatiques ou des bords des cours d'eau (roseaux, joncs, scirpes, choins, laïches...). Les sites les plus typiques sont les prairies humides abandonnées, les prairies à joncs, les mégaphorbiaies, les bords des fossés et des ruisseaux.

MENACES

- Assèchement des zones humides
- Destruction des prairies humides (assèchement, drainage, engraissement, plantations de peupliers...)
- Fauche non différenciée et pâturage intensif
- Fragmentation des habitats ouverts humides

MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Protection des zones humides
- Création de mares (cf fiche CCVA-03)
- Entretien adapté de la végétation rivulaire
- Sensibilisation des propriétaires




Femelle de Conocéphale des roseaux



Habitat humide favorable

Phénologie (période d'activité) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Présent toute l'année, le Conocéphale des roseaux réalise l'ensemble de son cycle sur le territoire de la CCVA.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))
- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-084

Criquet des roseaux

Mecostethus parapleurus



Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge Régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Protection nationale	Protection Régionale
VU	EN	X			

HABITATS

Le Criquet des roseaux se retrouve surtout dans des milieux humides comme des prairies de fauche inondables. Il peut ponctuellement se retrouver dans des pelouses sèches avec une strate herbacée haute.

Les adultes se tiennent dans la végétation herbacée et préfèrent quand celle-ci est assez haute. La femelle pond ses œufs dans le sol.

MENACES

- Assèchement des zones humides
- Destruction des prairies humides (assèchement, drainage, engraissement, plantations de peupliers...)
- Fragmentation des habitats ouverts humides

MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Protection des zones humides
- Création de mares (cf fiche CCVA-03)
- Entretien adapté de la végétation rivulaire
- Sensibilisation des propriétaires




Accouplement chez le Criquet des roseaux



Fossés humides

Phénologie (période d'activité) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Présent toute l'année, le Criquet des roseaux réalise l'ensemble de son cycle sur le territoire de la CCVA.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))
- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-085

Grillon des torrents *Pteronemobius lineolatus*



Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge Région ale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Protection nationale	Protection Région ale
VU	EN	X			

HABITATS

En Indre-et-Loire, elle colonise les berges humides des bords de Loire et plus ponctuellement en bord de mares. Les individus se dissimulent sous les pierres ou parmi les feuilles mortes, au niveau du sol. Très agiles, ils s'échappent en bondissant à la moindre alerte et sont très difficiles à observer.

MENACES

- Modification de la dynamique fluviale
- Artificialisation des berges
- Destruction des zones humides

MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Préservation des berges naturelles
- Création de mares (cf fiche CCVA-03) avec l'installation de pierriers




Femelle de Grillon des torrents



Berges rocailleuses

Phénologie (période d'activité) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Présent toute l'année, le Grillon des torrents réalise l'ensemble de son cycle sur le territoire de la CCVA.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))
- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-086

Ædipode aigue-marine *Sphingonotus caeruleus*



Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge Régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Protection nationale	Protection Régionale
VU	NT	X			

HABITATS

L'Ædipode aigue-marine est une espèce pionnière et thermophile. Elle est typique des pelouses sableuses des bords de cours d'eau (Loire), des sablières et des gravières sèches dénuées de végétation.

Les adultes, très mimétiques, sont plus facilement repérables en vol.

MENACES

- Modification de la dynamique fluviale conduisant à la végétalisation des grèves et des sablières
- Circulation d'engins motorisés
- Espèces exotiques envahissantes

MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Préservation des habitats pionniers
- Sensibilisation des habitants




Ædipode aigue-marine



Grèves de Loire à Nazelles-Négron

Phénologie (période d'activité) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Présent toute l'année, l'Ædipode aigue-marine réalise l'ensemble de son cycle sur le territoire de la CCVA.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))
- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-087

Tétrix des plages

Paratettix meridionalis



Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge Régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Protection nationale	Protection Régionale
	Nouvelle espèce				

HABITATS

Ce criquet hygrophile occupe les franges humides du bord des eaux (berges vaseuses, alluvions sableuses ou caillouteuses), il est d'ailleurs qualifié de ripicole strict.

Récemment découvert dans la vallée de la Vienne où il semble répandu, le criquet est nettement plus rare sur le long de la Loire tourangelles.

MENACES

- Espèce en expansion vers le nord de la France, non menacée.




Tétrix des plages



Berges sablo-vaseuses à Noizay

Phénologie (période d'activité) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Présent toute l'année, le Tétrix des plages réalise l'ensemble de son cycle sur le territoire de la CCVA.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))
- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))
- Palussière (Laurent), 2021.- Découverte de *Paratettix meridionalis* en Indre-et-Loire. Recherches naturalistes, 12 :36-37

MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- En attente d'observations à plus long terme