



ESP-088

Azuré des Cytises

Glaucopsyche alexis



Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
LC	NT	X				

HABITATS

L'Azuré des Cytises se rencontre dans les milieux thermophiles ouverts et arbustifs comme les pelouses sèches, prairies mésophiles, landes, lisières buissonnantes.

Plantes-hôtes : Les chenilles se nourrissent de différentes Fabacées comme les Sainfoins, les Luzernes, les Coronilles, les Astragales, etc.

MENACES

- Diminution et fragmentation de ses habitats
- Conversion des prairies en cultures
- Abandon du pâturage, fermeture des milieux
- Fauche précoce

MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Maintien du pâturage (cf fiche CCVA-08)
- Maintien de milieux herbacés fauchés tardivement (cf fiche CCVA-08)
- Sensibilisation des propriétaires
- Suivi régulier de l'espèce




Azuré des Cytises



Habitat favorable, territoire de la CCVA

Phénologie (période d'activité) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Réalise son cycle complet au sein du territoire de la CCVA. La période de vol s'étend d'avril à juillet.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))
- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-089

Azuré du Serpolet

Phengaris arion



Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
LC	VU	X	Annexe IV		X	

HABITATS

Milieus ouverts bien ensoleillés et plutôt secs avec végétation rase type pelouses sèches, généralement avec la présence de Thym (Thymus spp.) et d'Origan (Origanum vulgare) qui sont ses plantes hôtes.

Relation interspécifique avec des espèces de fourmis du genre Myrmica. Son dernier stade larvaire se déroule dans des fourmilières.

MENACES

- Diminution et fragmentation de ses habitats
- Abandon du pâturage, fermeture des milieux
- Fauche précoce
- Destruction des fourmilières
- Pollution chimique (pesticides notamment)

MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Maintien du pâturage (cf fiche CCVA-08)
- Maintien de milieux herbacés fauchés tardivement (cf fiche CCVA-08)
- Sensibilisation des propriétaires
- Suivi régulier de l'espèce




Azuré du Serpolet



Habitat favorable, territoire de la CCVA

Phénologie (période d'activité) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Réalise son cycle complet au sein du territoire de la CCVA. La période de vol s'étend du mois de juin à août.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))
- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-090

Cuivré des marais

Lycaena dispar



Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
LC	VU	X	Annexe IV		X	

HABITATS

Le Cuivré des marais est un papillon présent dans les milieux humides, principalement les prairies humides ou inondables, mais aussi les marécages, les friches.

Plantes-hôtes : Les chenilles se développent généralement sur des Polygonacées du genre *Rumex*, notamment *Rumex aquaticus*, *Rumex crispus* et *Rumex obtusifolius*.

MENACES

- Mise en culture des prairies naturelles
- Drainage des prairies
- Plantations de peupliers
- Abandon du pâturage, fermeture des milieux
- Comblement des marais
- Fauche précoce (mai/juin)

MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Conservation et restauration de prairies humides (cf fiche CCVA-08)
- Pâturage extensif
- Fauches tardives (automne)
- Dans le cas de fauches précoces, conserver des bandes enherbées non fauchées en périphérie de parcelle
- Sensibilisation des propriétaires
- Suivi régulier de l'espèce




Cuivré des marais (mâle)



Habitat favorable, territoire de la CCVA

Phénologie (période d'activité) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Réalise son cycle complet au sein du territoire de la CCVA. La période de vol s'étend du mois de mai à septembre.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))
- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-091

Ecaille des steppes

Arctia testudinaria



Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
	VU	X				

HABITATS

L'écaille des steppes se trouve dans les milieux ouverts comme les prairies de fauche, aussi bien dans des milieux thermophiles qu'hygrophiles.

C'est une espèce polyphage qui se nourrit de plantes basses comme les Achillées, Pissenlits, Oseilles, Euphorbes...

MENACES

- Fragmentation de son habitat
- Fauches précoces
- Fermeture des milieux herbacés
- Pollutions, produits chimiques

MESURES DE CONSERVATION

- Fauches tardives des prairies (fin été, automne) (cf fiche CCVA-08)
- Sensibilisation des propriétaires et des gestionnaires




Ecaille des steppes



Habitat favorable, territoire de la CCVA

Phénologie (période d'activité) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Réalise son cycle complet au sein du territoire de la CCVA. La période de vol s'étend de mai à juillet et d'octobre à novembre.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))
- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-092

Mélitée de la Lancéole

Melitaea parthenoides



Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
LC	EN	X				

HABITATS

La Mélitée de la Lancéole se rencontre dans les milieux mésophiles ensoleillés (prairies et pelouses riches en fleurs).

Plantes-hôtes : Les chenilles se nourrissent majoritairement de Plantaginacées comme le Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata*) et le Plantain moyen (*Plantago media*).

MENACES

- Conversion des prairies en cultures
- Déprise agricole
- Banalisation des milieux
- Diminution et fragmentation de ses habitats
- Pollution chimique (pesticides notamment)

MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Conservation des prairies naturelles
- Pâturage extensif (cf fiche CCVA-08)
- Maintien de milieux herbacés fauchés irrégulièrement (cf fiche CCVA-08)
- Sensibilisation des propriétaires



© J-P. FAVRETTO

Mélitée de la Lancéole



© T. RIVIERE

Habitat favorable, territoire de la CCVA

Phénologie (période d'activité) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Réalise son cycle complet au sein du territoire de la CCVA. La période de vol s'étend du mois de mai à septembre.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))
- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-093

Petit Collier argenté

Boloria selene



Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
NT		X				

HABITATS

Le Petit Collier argenté se rencontre dans les allées forestières humides, clairières, lisières.

Plantes-hôtes : Les chenilles se nourrissent de Violettes sauvages (*Viola canina*, *Viola riviniana*, ...).

MENACES

- Disparition des zones humides, drainage des fossés et des zones humides
- Conversion des prairies en cultures
- Sylviculture intensive
- Diminution et fragmentation de ses habitats
- Pollution chimique (pesticides notamment)


MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Conservation des prairies humides (avec pâturage extensif / fauche tardive) (cf fiche CCVA-08)
- Sylviculture en futaie avec un tapis herbacé diversifié
- Sensibilisation des propriétaires



© F. VIDRIL


Petit Collier argenté



© T. RIVIERE

Habitat favorable, territoire de la CCVA

Phénologie (période d'activité) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Réalise son cycle complet au sein du territoire de la CCVA. La période de vol s'étend du mois de mai à septembre.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))
- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-094

Thécla de l'Orme *Satyrrium w-album*



Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
LC	VU	X				

HABITATS

Le Thécla de l'Orme fréquente les haies bocagères et les lisières dans lesquelles poussent des Ormes.

Plantes-hôtes : Les chenilles se développent sur les Ormes, par exemple l'Orme champêtre (*Ulmus minor*).

MENACES

- Graphiose qui affecte les Ormes
- Diminution et fragmentation de son habitat

MESURES DE CONSERVATION

- Plan de prospections ciblées à partir de cartographies des zones riches en Ormes
- Maintien de l'Orme en forêt, dans les haies avec une gestion sylvicole et agricole adaptée
- Sensibilisation des propriétaires



Thécla de l'Orme



Habitat favorable, territoire de la CCVA

Phénologie (période d'activité) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Réalise son cycle complet au sein du territoire de la CCVA. La période de vol s'étend de fin-mai à début août.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))
- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-095

Zygène du Lotier

Zygaena loti



Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
	NT	X				

HABITATS

La Zygène du Lotier affectionne les milieux herbacés ensoleillés, les pelouses calcicoles, les prairies sèches.

Plantes-hôtes : La chenille se nourrit de Trèfles (*Trifolium*), Lotiers (*Lotus*), Sainfoins (*Onobrychis*) ...

MENACES

- Fragmentation de son habitat
- Fermeture des milieux herbacés
- Fauches précoces
- Pollutions, produits chimiques


MESURES DE CONSERVATION

- Fauches tardives des prairies (fin été, automne)
- Sensibilisation des gestionnaires



© A. TINCHANT


Zygène du Lotier



© F. ROSE

Habitat favorable, territoire de la CCVA

Phénologie (période d'activité) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Réalise son cycle complet au sein du territoire de la CCVA. La période de vol s'étend de mai à août.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))
- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-096

Zygène du Panicaut *Zygaena sarpedon*



Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
	VU	X				

HABITATS

La Zygène du Panicaut affectionne les milieux chauds et secs comme les levées de la Loire. Ce papillon apprécie également les prairies maigres des terrasses sableuses en marge du fleuve, et de façon plus ponctuelle les coteaux et les pelouses calcicoles.

Plantes-hôtes : La chenille se nourrit de Panicaut des champs (*Eryngium campestre*).

MENACES

- Fragmentation de son habitat
- Fermeture des milieux herbacés
- Travaux liés aux levées de la Loire

MESURES DE CONSERVATION

- Maintien des levées de Loire au stade herbacé avec une fauche annuelle à l'automne
- Sensibilisation des gestionnaires




Zygène du Panicaut



Habitat favorable, territoire de la CCVA

Phénologie (période d'activité) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Réalise son cycle complet au sein du territoire de la CCVA. La période de vol s'étend de fin mai à fin juillet.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))
- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-097

Zygène du Sainfoin

Zygaena carniolica



Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Directive Oiseaux	Protection nationale	Protection régionale
		X				

HABITATS

La Zygène du Sainfoin affectionne les milieux herbacés ensoleillés, les pelouses calcicoles, les prairies sèches.

Plantes-hôtes : La chenille se nourrit de Lotiers (*Lotus sp.*), Anthyllides (*Anthyllis sp.*) et Sainfoins (*Onobrychis sp.*).

MENACES

- Fermeture des milieux herbacés
- Fauches précoces
- Fragmentation de son habitat
- Pollutions, produits chimiques

MESURES DE CONSERVATION

- Fauches tardives des prairies (fin été, automne)
- Sensibilisation des gestionnaires




Zygène du Sainfoin



Habitat favorable, territoire de la CCVA

Phénologie (période d'activité) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Réalise son cycle complet au sein du territoire de la CCVA. La période de vol s'étend de juillet à août.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))
- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))



ESP-098

Laineuse du prunellier

Eriogaster catax



Statuts de conservation et protection

Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	ZNIEFF	Directive Habitats, Faune, Flore	Protection nationale	Protection régionale
Non évalué	VU	X	Annexe II et IV	X	

HABITATS

La Laineuse du prunellier se rencontre dans les milieux ouverts et embroussaillés, notamment par les prunelliers et les aubépines abrités du vent.

Ses chenilles forment des nids de soie communautaires facilement observable sur les arbustes hôtes.

MENACES

- Changement de vocation des parcelles embroussaillées (photovoltaïque, boisements)
- Arrachage des haies bocagères
- Pesticides
- Fragmentation des habitats

MESURES DE CONSERVATION

- Amélioration des connaissances (prospections, consultation des bases de données Faune-Touraine, Obs'37)
- Préservation des habitats de l'espèce (haies et fourrés)
- Maintien d'une activité agricole traditionnelle (limitation des traitements chimiques) (cf fiche CCVA-08)




Laineuse du prunellier adulte



Nid communautaire

Phénologie (période d'activité) :




Nombre d'observations de l'espèce par mois en Région Centre-Val de Loire
© Nature'O'Centre

Quelle partie du cycle biologique est réalisée sur la CCVA?

Présent toute l'année, la Laineuse du prunellier réalise l'ensemble de son cycle sur le territoire de la CCVA.

Localisation des données de présence de l'espèce sur la CCVA



Pour en savoir +

- Lizmap, carte interactive de l'ABC ([lien](#))
- Nature'O'Centre, page de l'espèce ([lien](#))